

Glux® 30%-ige wässrige Glucoselösung, steril

Zusammensetzung

Wasser für Injektionszwecke, Glucose (Ph.Eur.)

Darreichungsform

100 aseptisch abgefüllte Einzeldosen in Kunststoffampullen à 0,7 ml

Zweckbestimmung

Glux® 30%-ige Glucoselösung zur oralen Anwendung dient bei Früh- und Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern bis zu einem Alter von 12 Monaten zur Ablenkung von Schmerz durch Reizüberlagerung bei der Anwendung chirurgisch invasiver Medizinprodukte und nicht chirurgisch invasiven Interventionen, wie zum Beispiel

- Kapillaren zur venöse / arterielle Blutentnahme
- Anlegen eines peripheren Venenkatheters
- Anlegen eines peripheren Arterienkatheters
- Peripher gelegter zentraler Venenkatheter (Denis)
- s.c. / i.m. Injektionen
- Anlegen eines Blasenkatheters
- Pharyngeales Absaugen
- Extubation
- Entfernung von Wundverschlüssen, Verbänden, Pflastern etc.
- Magensonde legen / entfernen
- EKG Elektroden entfernen

Anwendung

Den Inhalt einer Ampulle Glux® 2 Minuten vor Anwendung chirurgisch invasiver und nicht invasiver Medizinprodukte in den Mund der Früh- und Neugeborenen, Säuglinge und Kleinkinder bis 12 Monate träufeln. Gegebenenfalls nachgeben.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Gegenanzeigen

Nicht bei fehlender enteraler Ernährung anwenden!
 Nicht anwenden bei nekrotisierender Enterocolitis (NEC)!
 Nicht bei fehlender Koordination Atmung- Saugen- Schlucken anwenden!
 Nicht bei größeren schmerzhaften Eingriffen anwenden!

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise

- nur bei eingeleiteter enteraler Ernährung
- nur bei wachen Früh- und Neugeborenen sowie Kleinkindern bis zu einem Alter von 12 Monaten anwenden
- nur zur Reizüberlagerung bei kleineren schmerzhaften Eingriffen anwenden
- wenn nötig, zusätzlich andere schmerzlindernde Maßnahmen durchführen
- Verabreichung von Zuckerlösung kann beim Früh- und Neugeborenen zu einer Geschmacksvorliebe für Süßes führen.

Lagerungs- und Warnhinweise



Nicht über 25 °C lagern



steril



Einmalgebrauch: geöffnete Ampullen nicht mehrmals verwenden.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Zuckerlösung nur zur Schmerzbekämpfung, nicht als Belohnung verwenden!



Hersteller

CE0482

Hälsa Pharma GmbH
 Maria-Goeppert-Straße 5
 D-23562 Lübeck

Vertrieb

Desitin Arzneimittel GmbH
 Weg beim Jäger 214
 D-22335 Hamburg

Stand der Information
 Mai 2017

