

Chloraldurat® 250 mg/500 mg.

Wirkstoff: Chloralhydrat (Ph. Eur.).

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Weichkaps. Chloraldurat® 250 mg/500 mg enth. 250 mg/500 mg Chloralhydrat (Ph. Eur.). **Sonst. Bestandt.:** Macrogol 400, Gelatine, Glycerol 85%, Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbitol (Ph. Eur.); Titandioxid (E 171), Ponceau 4R, 80% (E 124). -500 mg zusätzl.: Eisen(II,III)-oxid (E 172).

Anw.-gebiete: Kurzzeitbehandl. v. Schlafstörungen (Chloraldurat® 500 mg insbes. wenn höhere Dosierg. erforderl.). Hypnotika sollten nur b. Schlafstör. v. klinisch bedeuts. Schweregrad angew. werden.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. Chloralhydrat, Ponceau 4R od. sonst. Bestandt., schw. Leber- od. schw. Nierenschäden, schw. Herz- u. Kreislaufschwäche, Antikoagulantientherapie (Cumarin-Typ), Schwangerschaft, Stillzeit, Kdr. u. Jugendl. unter 18 J.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arzneimittel für Kinder unzugängl. aufbewahren. Enthält Ponceau 4R und Sorbitol.

Nebenwirk.: *Sehr selten:* Torsade de Pointes. *Häufigk. nicht bekannt:* Benommenh., Schwindel, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschw. (Blähungen, Druckgefühl, Übelk., Durchfall), psych. Beeinträchtigungen (z. B. Verwirrth., Ängstlichk., Unruhe), allerg. Reaktionen (v. a. der Haut), Müdigk. am nächsten Morgen, Schlafstör., Verlängerung d. QT-Intervalls i. EKG. Allerg. Reakt. durch Ponceau 4R mögl. Bei längerem Gebrauch v. Chloralhydrat Risiko e. Abhängigkeitsentwickl. Darüber hinaus Toleranzentwickl. mögl.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de

Oktober 2014