

## Liskantin® 250 mg/Tablette

## Liskantin® Saft, 25 mg/ml Suspension zum Einnehmen

**Wirkstoff:** Primidon

### Verschreibungspflichtig

**Zus.: Arzn. wirks. Bestandt.-Tbl.:** 1 Tbl. enth.: Primidon 250mg. **Sonst. Bestandt.:** Gelatine, Gelatinehydrolysat, Magnesiumstearat [pflanzlich], Maisstärke, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), gefälltes Siliciumdioxid, hochdisp. Siliciumdioxid, methyliert. **-Saft: Arzn. wirks. Bestandt.:** 1ml Suspension enth.: Primidon 25mg. **Sonst. Bestandt.:** Aroma, Docusat-Natrium, Kaliumdihydrogenphosphat, Methyl-4- hydroxybenzoat (E218), Dinatriumhydrogenphosphat, Propyl-4-hydroxybenzoat (E216), Natriumcyclamat, Xanthangummi, gereinigtes Wasser.

**Anw.-gebiete:** Epilept. Anfälle, bes. Grand-mal-Anf., fokale Anf. (Jackson-Anf., Adversivkrämpfe, psychomotor. Anf. u.a.), myoklon. Anf. d. Jugendalters (Impulsiv-Petit-mal). Bei Absencen u. and. kindlich. Petit-mal-Epileps. ist Primidon b. entsprech. EEG-Anzeichen als Grand-mal-Prophyl. indiziert.

**Gegenanz.:** Überempf. gg. Primidon, Barbiturate od. and. Bestandt. d. AM; akute Vergift. m. zentral dämpf. wirks. Pharmaka (z.B. Schlafmittel, Analgetika, Psychopharmaka) od. Alk.; akute hepat. Porphyrie; schw. Leber- od. Nierenfunkt.-stör.; schw. Myokardschäden. **-Saft:** Überempf. gg. Methyl-4-hydroxybenzoat od. Propyl-4-hydroxybenzoat.

**Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.:** Arzneimittel f. Kdr. unzugängl. aufbewahren.

**Nebenwirk.:** *Sehr häufig:* zu Beginn d. Ther.: Teilnahmslosigk., Schwindel, Somnolenz, Ataxie, Akkomodationsstör., Übelk., Erbr. (Vermeid. durch einschleich. Ther.). In 20% d. Fälle Müdigk., Gleichgewichtsstör. (Plasmakonz. > 8 mg Primidon/l.). *Häufig:* megaloblast. Anämie (revers. n. Gabe v. Folsäure od. Vit. B<sub>12</sub>), erniedr. T<sub>4</sub> u. FT<sub>4</sub> b. unveränd. Schilddrüsenfunkt., veränd. Kalzium- u. Vit.-D-Stoffwechs. (Hypokalzämie, Gabe v. Vit. D b. Risikopat. – z.B. Kdrn. u. Schwang. – empfohlen), erhöh. alkal. Phosphatase u. γ-GT (keine Ther.-änder. erforderl. solange GOT u. GPT i. Normber.), makulopapul. Exanthem (fast ausnahmslos ohne allerg. Allgem.-Sympt.). *Gelegentl.:* schwere Veränd. des Vit.-D Stoffwechsels -metaphysäre Osteodystrophien od. e. sog. „Rachitis antiepileptica“ (Gabe v. Vit D empf.). Intermitt. Primidon-induz. Schulterbeschw.. *Selten:* Stör. d. Blutbildes (z.B. Leuko- u. Thrombozytopenie), Porphyrie, Dupuytren`sche Kontraktur. *Häufigk. nicht bekannt:* 1 Fall e. Agranulozytose, Lupus erythematodes, v. a. b. Kdrn. Stör. d. emot. Verhaltens (Reizbark., Verstimmung); Kdr. u. ält. Leute: paradoxe Reakt. m. Unruhe u. Erregungszust.; Gedächtnis- u. Konzentrationsstör., Wesensänder., psych. Reakt., Ophthalmoplegia ext., Polyradikulitis, Nystagmus, Doppelbilder, Dermatitis bullosa, Stevens-Johnson-Syndr., Lyell-Syndr., Dermatitis exfoliativa, DRESS-Syndr., Impotenz, vermind. Libido, Appetitlosigk. bis hin z. Anorexie. Abn. d. Knochendichte, Osteoporose, Frakturen b. Pat. unter Langzeither. (Mechanism. d. Beeinfluss. d. Knochenmetabolism. unklar).

### Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; [www.desitin.de](http://www.desitin.de)

Juli 2021