

Petnidan® 250 mg/Weichkapseln

Petnidan® Saft, 50mg/ml Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff: Ethosuximid

Verschreibungspflichtig

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt., –Kaps.: 1 Weichkaps. enth. Ethosuximid 250 mg. *Sonst. Bestandt.:* Eisenoxidhydrat (E172), Gelatine, Glycerol, D-Mannitol – D-Glucitol – Sorbitan – höhere Polyole-Gemisch, Macrogol 300, Mittelkettige Triglyceride, Titandioxid (E171), gereinigtes Wasser. *Arzneil. wirks. Bestandt., Saft:* 1 ml Lösung z. Einn. enth.: 50 mg Ethosuximid. *Sonst. Bestandt.:* Karamell-Aroma, Citronensäure (E330), Hypromellose, Macrogol 300, Methyl-4-hydroxybenzoat, Natriumsalz (E219), Saccharin-Natrium, gereinigtes Wasser.

Anw.-gebiete: Pyknolept. Absencen sowie komplexe u. atyp. Absencen. *Hinweis:* z. Vermeid. d. b. komplexen u. atyp. Absencen häufig hinzukomm. großen Anfälle kann Ethosuximid m. entspr. wirks. Antikonvulsiva (z.B. Primidon, Phenobarbital) komb. werden. Nur b. pyknolept. Absence-Epilepsien d. Schulalters kann auf e. zusätzl. Grand-mal-Prophyl. verzichtet w. Myoklon.-astatisches Petit-mal u. Impulsiv-Petit mal, wenn and. Arzneim. nicht wirks. waren u./od. nicht vertragen wurden.

Gegenanz.: Überempf. gg. Ethosuximid, Succinimide od. e. d. sonst. Bestandteile. –*Saft zusätzl.:* Überempf. gg. Methyl-4-hydroxy-benzoat.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arzneim. f. Kdr. Unzugängl. aufbewahren. Enth. Sorbitol.

Nebenwirk: Im therapeut. Dosisber. b. ca. 1/6 d. Pat. (Vermind. d. Auftretens durch einschleich. Dos. u. Einn. währ. od. nach d. Mahlz.): *Häufig:* Übelk., Erbr., Singultus, Leibschm.; *Gelegentl.:* Lethargie, Zurückgezogenh., schw. Kopfschm., Schlaf- u. Appetitstör., Gewichtsverl., Diarrhoe, Verstopf., Ataxie, Ängstlichk.; *Selten:* paranoid-halluzinator. Erschein. (Entwickl. innerh. v. Tag. u. Wo.); *Häufigk. nicht bekannt:* revers. Dyskinesien innerh. 12 Std. n. Ther.-Beginn (ggf. Gabe v. Diphenhydramin). Verstimmungs-/Erregungszust., Müdigk., Reizbark. Dosisunabh.: *Selten:* Lupus erythematodes, Leuko-, Thrombopenie, Eosinophilie, Agranulozytose; *Häufigk. nicht bekannt:* allerg. Hauterschein. (z.B. Exantheme, Stevens-Johnson-Syndr.), DRESS, aplast. Anämie, Panzytopenie, eingeschr. kogn. Leistungsfähigk. unter Dauerbehandl.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de

März 2021