

Pflichttext:
isicom® retard 100 mg/25 mg, -200 mg/50 mg Retardtabletten

isicom® retard 100 mg/25 mg, -200 mg/50 mg Retardtabletten

Wirkstoff: Levodopa, Carbidopa

Verschreibungspflichtig.

Zus.: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 1 Retardtbl. (100 mg/25 mg) enth. Levodopa 100 mg, 27 mg Carbidopa-Monohydrat (entspr. 25 mg Carbidopa). 1 Retardtbl. (200 mg/50 mg) enth. Levodopa 200 mg, 54 mg Carbidopa-Monohydrat (entspr. 50 mg Carbidopa). *Sonst. Bestandt.:* Tbl.-kern: Fumarsäure, Hypromellose, Natriumstearylumfumarat (Ph.Eur.), hochdisp. Siliciumdioxid, Chinolingelb (E104). Filmüberzug: Hypromellose, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Eisen (III)-oxid (E172), Titandioxid (E171), Macrogol 6000.

Anw.gebiete: Zusatzbehandl. v. Morbus Parkinson b. Pat., b. denen unter Behandl. m. konventionellen, nicht-retard. Levodopa/Decarboxylasehemmern motor. Fluktuationen auftraten. Dient nicht d. Behandl. medikamentös induz. extrapyramidal-motor. Erschein.

Gegenanz.: Überempf. gg. die Wirkstoffe od. e. d. sonst. Bestandt., Gabe v. nichtselektiven MAO-Hemmern gleichz. u. bis 2 Wochen vorher. Melanom od. verdächtige, noch nicht diagnost. Hautveränd., Engwinkelglaukom.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anw.: Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Enthält Natrium.

Nebenwirk.: Häufigste NW: Dyskinesien. *Sehr häufig:* Harnwegsinf. *And. häufig. NW:* Chorea, Dystonien, On-Off-Phänomene (Wechsel v. Beweglich- u. Unbeweglichk.), Muskelkrämpfe, Schwindel, Übelk., Erbr., Appetitlosigk., Verstopf., Durchfall, Dyspepsie, Mundtrockenh., orthostat. Regulationsstör. (Blutdruckabfall beim Wechsel d. Körperlage) einschl. hypotensiver Episoden, Atemnot, Halluzinat., Verwirrth., Alpträume, Schläfrigkeit. (einschl. sehr selten auftretender übermäß. Tagesmüdigk. u. Schlafattacken), Schlaflosigk., Depression, Asthenie, Kopfschm., Parästhesien, Brustschm. *Gelegentl.:* Gewichtsverlust, Agitierth., Angst, Orientierungsstör., vermind. geistige Leistungsfähigk., Bewegungs- u. extrapyramidal-motor. Stör., Synkope, Palpitationen, Bauchschm., Urtikaria, Gangstör., Fallneig. *Selten:* psychot. Zustandsbilder wie Wahnideen u. paranoide Gedankenbild., depress. Verstimm. u. U. m. Suizid tend., malignes neurolept. Syndrom, Verschwommensehen, Flushing, dunkler Speichel, Schweiß und Urin, Alopezie, Angioödem, Pruritus, Hautausschlag, Abgeschlagenheit. *Häufigk. nicht bekannt:* Dopamin-Dysregulationssyndr. (Suchterkrank. m. zwangh. Missbrauch d. dopaminergen AM bei Verwend. höherer Dosen als z. adäquat. Kontrolle v. motor. Sympt. d. Parkinson-Krankh. erforderl.; in einig. Fällen schwere Dyskinesien mögl.), Impulskontrollstör. (patholog. Spielsucht, Libidosteiger., Hypersexualität, zwanghaft. Geldausgeben od. Einkaufen, Essattacken u. Esszwang), malign. Melanom, Agranulozytose, Leukopenie, hämolytische u. nicht-hämolytische Anämie, Thrombozytopenie, Gewichtszunahme, Zähneknirschen, Demenz, Euphorie, Aktivier. eines latenten Horner-Syndr., Ataxie, bitterer Geschmack, Konvulsionen, Ohnmachtsgefühl, verstärkt. Tremor d. Hände, Taubheitsgefühl, angeregte Stimm., insb. unter hohen Levodopa-Dosen Polyneuropathie mögl., Blepharospasmus, Mydriasis, Diplopie, Blickkrämpfe (okulogyre Krisen), kardiale Arrhythmien, Hitzegefühl, Hypertonie, Phlebitis, unregelm. Atmung, Heiserk., Zungenbrennen, Entwickl. eines Duodenalulcus, Dysphagie, Flatulenz, abdominale Blutungen, Schluckauf, Speichelfluss, Henoch-Schoenlein-Purpura, vermehrtes Schwitzen, Muskelzucken, Trismus, im Rahmen v. schw. Dyskinesien od. malign. Levodopa-Enzugssyndr. b. Parkins.-Pat. Rhabdomyolyse mögl., Harninkontinenz, Harnretention, Priapismus, Ödeme, Mattigk., Schwäche.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, www.desitin.de

Stand der Information: August 2023