

Pflichttext:
Thiola® 100mg/250 mg

Thiola® 100 mg
Thiola® 250 mg

Wirkstoff: Tiopronin.

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 überzogene Tablette Thiola® 100mg/250mg enth. 100mg/250mg Tiopronin. **Sonstige Bestandt.:** Lactose, Povidon K29-32, Talkum, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) pflanzl., Mikrokristalline Cellulose, Simeticon 100, Basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.) (MW: ca. 150000), Schellack (Ph.Eur.) wachsfrei, Hochdisp. Siliciumdioxid, Calciumcarbonat, Titandioxid (E171), Sucrose, Arabisches Gummi sprühgetrockn., Gebleichtes Wachs, Carnaubawachs.

Anw.-gebiete: Cystinurie, Cystinuroolithiasis, Schwermetallvergift. (insb. Quecksilber, Kupfer, Eisen), Hämosiderose (Eisenüberlad.), Morbus Wilson (Kupferüberlad.)

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. Tiopronin/sonst. Bestandt. d. Arzneim., Albuminurie, Glomerulonephritis, Myasthenie, Polymyositis, Arzneim.-bedingt. Zytopenien, Pemphigus, Stillzeit.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Enth. Lactose u. Sucrose.

Nebenwirk.: *Gelegentl.:* Gastrointest. Beschwerd. (Magenverstimm., Diarrhö), Stör. d. Geschmacksinns, Temperaturerhöh., Hautreakt. (Pruritus, Stomatitis, Pemphigus, maculopapul. Exanth., Erythema multif., ekzematös. Eruptionen). *Selten:* Anstieg d. Transaminasen, Hepatitis, Thrombozytopenie, Leukopenie, Einzelfälle v. Agranulozytose, Nephropathie, nephrot. Syndr., Proteinurie, Senk. d. Blutzuckerspiegels. Fälle v. Albuminurie als Folge e. Nephropathie sowie Cytopenien. Überwach. v. Blutbild u. Urinstat. B. Anzeichen sofort absetzen. *Sehr selten:* Myopathie, Pneumopathie, Bronchiolitis obliterans, Myasthenia gravis. Keine gekreuzte Intoler. zw. Tiopronin u. Penicillamin: Nebenwirk. Unter Penicillamin-Ther. nicht zwangsläuf. b. Tiopronin-Ther.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

DESITIN Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de

April 2022