

Wann muss der Notarzt gerufen werden?

Halten Sie sich **IMMER** an die Anweisungen, die Ihnen der behandelnde Arzt des Betroffenen für die Anwendung von Midazolam DESITIN® gegeben hat bzw. an die Erklärungen des medizinischen Fachpersonals.

Im Zweifelsfall ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn:

- sich der Krampfanfall nicht innerhalb von 10 Minuten nach der Behandlung legt.
- Sie die Spritze nicht vollständig verabreichen können oder Sie einen Teil des Inhalts verschüttet haben.
- sich die Atmung des Betroffenen verlangsamt oder ganz aufhört, z. B. wenn der Patient nur noch langsam oder flach atmet oder blaue Lippen bekommt.
- Sie Anzeichen für einen Herzinfarkt beobachten, wie z.B. Schmerzen im Brustkorb, die in den Hals- und Schulterbereich sowie in den linken Arm ausstrahlen.
- sich der Betroffene erbricht und der Krampfanfall sich nicht innerhalb von 10 Minuten nach der Behandlung legt.
- Sie zu viel Midazolam DESITIN® gegeben haben und Anzeichen von Überdosierung vorhanden sind, wie z. B.:
 - Schläfrigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit
 - Verwirrtheit oder Desorientiertheit
 - Fehlen des Kniereflexes oder einer Reaktion bei Kneifen des Patienten
 - Atembeschwerden (verlangsamte oder flache Atmung)
 - Blutdruckabfall (Schwindelgefühl und Schwächeanfall)
 - Koma

Bitte beachten Sie die aktuelle Gebrauchsinformation.

Mat.-Nr.: 230252 Stand: 09/21



Weitere Informationen zum Thema Epilepsie finden Sie unter www.desitin.de




Anleitung zur Anwendung

Midazolam DESITIN®
Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle*

* Zur Behandlung länger anhaltender, akuter Krampfanfälle im Alter zwischen 3 Monaten und unter 18 Jahren.

Midazolam DESITIN®




1

Schritt 1

- Es ist wichtig, dass der Betroffene sich bei einem Krampfanfall frei bewegen kann.

Entfernen Sie daher mögliche Gefahrenquellen und versuchen Sie nicht, die Bewegungen durch Festhalten zu verhindern.




2a

Schritt 2


- a** Nehmen Sie das Kunststoff-Schutzröhrchen, welches Midazolam DESITIN® enthält.

Kontrollieren Sie das Verfallsdatum auf dem Röhrchen und überprüfen Sie es auf mögliche Beschädigungen.



2b

- b** Reißen Sie das Originalitätssiegel des Röhrchens auf und entnehmen Sie die Applikationsspritze.



3

Schritt 3

- Ziehen Sie die durchsichtige Kappe von der Spitze der Applikationsspritze ab.
- Entsorgen Sie die abgezogene, durchsichtige Kappe sicher.



4a

Schritt 4

- a** Fassen Sie mit einer Hand vorsichtig die Wange des Betroffenen mit Zeigefinger und Daumen und ziehen Sie die Wange leicht zurück.
- Führen Sie mit der anderen Hand das Spritzenende zwischen Wange und Zahnfleisch des Unterkiefers.
- Drücken Sie langsam den Spritzenkolben bis zum Anschlag herunter, sodass die gesamte Menge der Lösung langsam in den Zwischenraum zwischen Zahnfleisch und Wange gelangt.
- b** Falls erforderlich (bei größeren Volumina und/oder kleineren Patienten) sollte ungefähr die Hälfte der Dosis langsam in die eine Seite der Mundhöhle und die andere Hälfte anschließend in die andere Seite eingebracht werden.

! Geben Sie nicht mehr von dem Arzneimittel als die Dosis, die der Arzt verordnet hat!



5

Schritt 5

- Heben Sie die leere Spritze auf, um sie ggf. den Rettungssanitätern oder dem Notarzt zeigen zu können.
- Bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie bei dem Betroffenen, bis der Krampfanfall sich wieder gelegt hat.