

Pflichttext:

Apydan® extent 150 mg/300 mg/600 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Apydan® extent 150 mg/300 mg/600 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung.

Wirkstoff: Oxcarbazepin.

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Tabl. Apydan® extent 150 mg/300 mg/600 mg enth. 150 mg/300 mg/600 mg Oxcarbazepin. *Sonst. Bestandt.:* Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B), Riboflavin, mikrokrist. Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzl.]

Anw.-gebiete: Fok.e Anfälle mit od. ohne sek. general. tonisch-klon. Anfälle in Mono- od. Kombi.-Therapie bei Erw. u. Kdrn. ab 6 J.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. Oxcarbazepin, Eslicarbazepin od. e. d. sonst. Bestandt.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arzneim. f. Kdr. unzugängl. aufbewahren.

Nebenwirk.: *Sehr häufig* ($\geq 1/10$): Schläfrigk., Kopfschm., Schwindelgefühl, Doppelsehen, Übelk., Erbrechen, Müdigk. *Häufig* ($\geq 1/100$ bis $< 1/10$): Gewichtszun., Hyponatriämie, Verwirrheitszust., Depr., Apathie, Unruhe (z.B. Nervosität), Affektlabilit., Ataxie, Tremor, Nystagm., Konz.-schwäche, Gedächtnisstör., Sprechstör. (einschl. Dysarthrie); häufiger bei Dosissteig., Verschwommensehen, Sehstör., Schwindel, Diarrhoe, Verstopf., Bauchschm., Exanth., Alopezie, Akne, Schwächegefühl. *Gelegentl.* ($\geq 1/1.000$ bis $< 1/100$): Leukopenie, Hypothyreose, Hypertonie, Urtikaria, Anstieg d. Leberenzymwerte u./od. der alkal. Phosphatase, Sturz. *Selten:* Knochenmarkdepr., aplast. Anämie, Agranulozyt., Neutro-, Panzytopenie, anaphylakt. Reakt., Syndr. d. inadäquat. ADH-Sekret., DRESS Syndr., akute general. exanthem. Pustulose (AGEP), Abn. d. Knochendichte unter d. Bild v. Osteopor. bis hin zu patholog. Fraktur. b. Langzeitther., Abfall v. T4. *Sehr selten* ($< 1/10.000$): Thrombozytopenie, Überempf.-Reakt. (können mehr. Organe betr.): mögl. Sympt. Hautausschlag, Fieber, Angioödem; mögl. betroff. Organe: Blut-/Lymphsyst. (z.B. Eosinophilie, Thrombo-, Leukopenie, Lymphknotenschwell., Milzschwell.), Leber (z.B. Leberfunktionswerte außerh. D. Norm, Hepatitis), Muskeln u. Gelenke (z.B. Gelenkschwell., -schm., Myalgie), Nervensyst. (z.B. hepat. Enzephalopath.), Niere (z.B. Proteinurie, interstit. Nephritis, Nierenversag.), Lunge (z.B. Dyspnoe, Lungenöd., Asthma, Bronchospasm., interstit. Lungenerkr.). Hyponatriämie mit klin. Sympt. (wie epilept. Anf., Verwirrth., Bewusstseinstrüb., Enzephalopath., Sehstör., Erbrech. u. Übelk.), Arrhythmien, AV-Block, Pankreatitis u./od. Anstieg Lipase u./od. Amylase, Hepatitis, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndr., Lyell-Syndr., Erythema multiforme, system. Lupus erythematodes. *Häufigk. nicht bekannt:* Verschlecht. d. bestehend. Anfallsleidens bei Kdrn. (bei Anfallsform. außerhalb d. zugel. Anw. v. Apydan® extent. Daher Anw. nur f. d. zugel. Anw.-gebiete!), allerg. Kreuzreakt. m. and. Antiepileptika.

Weitere Hinweise siehe Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, www.desitin.de.

Stand der Information: Dezember 2021.