

## CLARIUM® 50 mg Retardtabletten

**Wirkstoff:** Piribedil.

### Verschreibungspflichtig.

**Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.:** 1 Ret.-Tabl. CLARIUM® 50 mg enth. 50 mg Piribedil. **Sonst. Bestandt.:** Povidon, Magnesiumstearat (Ph. Eur), Talkum, Na-Hydrogencarbonat, Carmellose-Na, gebleichtes Wachs, Titandioxid (E171), 3,87 mg Ponceau 4R Aluminiumsalz (E124), Polysorbat 80, 57,17 mg Saccharose (Sucrose), hochdisperses Siliciumdioxid.

**Anw.-gebiete:** Behandl. d. Parkinsonschen Krankh. entweder i. Mono- od. i. Kombinationstherapie m. L-Dopa von Behandlungsbeginn an od. sekundär.

**Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. Piribedil, Ponceau 4R od. andere i. Präparat enthält. Bestandteile, kardiovaskulärer Schock, i. d. akuten Phase e. Herzinfarktes, i. Kombination m. Neuroleptika (ausgenommen Clozapin); Pat. m. Neuroleptika-induz. extrapyramid. Syndr. sollten nicht m. dopaminerg. Antiparkinson-AM behand. werden (Blockade d. dopaminerg. Rezept. durch Neuroleptika).

**Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anw.:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Enthält Saccharose, Ponceau 4R, Natrium.

**Nebenwirk.:** *Häufig:* leichte Magen-Darm-Beschwerden (Übelk., Erbrechen, Blähungen), d. wieder verschwinden können, insbes. nach. individ. Dosisanpassung. Symptome i. Magen-Darm-Bereich können stark reduziert werden, indem d. Dosis stufenweise erhöht wird (alle 2 Wo. um 50 mg). Psychische Störungen wie Zerstreuth., Erregung od. Halluzinationen (visuell, akustisch, gemischt) od. Schwindelgefühl wurden beobachtet, d. wieder verschwinden, sobald d. Behandl. beendet wird. *Gelegentl.:* Hypotonie, orthostatische Hypotonie m. Synkopen, Unwohls. od. instabilem Blutdruck. *Sehr selten:* übermäßige Schläfrigkeit während d. Tages sowie plötzliche Schlafanfälle. *Nicht bekannt:* Schläfrigkeit, Impulskontrollstör. wie patholog. Spielsucht, Libidosteiger., Hypersexualität, zwanghaft. Geldausgeben od. Einkaufen, Essattacken u. Esszwang. Aggression u. psychot. Störungen (Wahnvorstellung, Delirium), Dyskinesien, periphere Ödeme. Ponceau 4R kann allerg. Reaktionen hervorrufen.

**Weitere Hinweise siehe Gebrauchs- bzw. Fachinformation.**

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, [www.desitin.de](http://www.desitin.de)

**Dezember 2021**