

Pflichttext

Lamotrigin Desitin® 5 mg/50 mg/quadro 100 mg/100 mg/ 200 mg Tabletten

Lamotrigin Desitin® 5 mg/50 mg/quadro 100mg/100mg/200mg Tabletten

Wirkstoff: Lamotrigin

Verschreibungspflichtig

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Tbl. enth. 5mg/50mg/100mg/200mg Lamotrigin. **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat, mikrokrist. Cellulose, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172) (außer 5mg), Povidon K30, Carboxymethylstärke-Na (Typ A) (Ph. Eur.), Mg-stearat (Ph. Eur.), Talkum, hochdisp. Siliciumdioxid.

Anw.gebiete: Erw. u. Jgdl. ab 13 J.: Zusatz- u. Monother. partiell. u. general. Anfälle einschl. ton.-klon. Anf. Kdr. u. Jgdl. von 2-12 J.: Zusatzther. b. partiell. u. general. Anf. einschl. ton.-klon. Anf., Monother. atyp. Absencen. Erw., Jgdl. u. Kdr. ab 2 J.: Zusatzther. b. Anf. im Zus.hang m. d. Lennox-Gastaut-Syndr., bei Erw. u. Jgdl. ab 13 J. auch als Initialther. Erw. ab 18 J.: Prävention depress. Episoden b. Pat. m. bipol. Stör.

Gegenanz.: Überempf. gg. Lamotrigin od. sonst. Bestandt. d. Arzneim., Carbamazepin od. Phenytoin.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arzneimittel f. Kdr. unzugängl. aufbewahr.. Enth. Lactose-Monohydrat.

Nebenwirk.: *Sehr häufig:* Kopfschm., Diplop., Schwommenseh., Hautausschlag (meist makulopapul.) *Häufig:* Aggressivität, Reizbarkeit, Somnol., Schwind., Tremor, Insomnie, Agitiertheit, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Mundtrockenheit, Arthralgie, Müdigkeit, Schmerz, Rückenschmerz. *Gelegentlich:* Ataxie, Lichtempfindlichkeitsreaktion, Alopezie. *Selten:* Nystagmus, asept. Meningitis, Konjunktivitis, SJS. *Sehr selten:* Hämophagozyt. Lymphohistiozyt. (HLH), Überempfindlichkeitsreaktion: Hautausschlag mit system. Sympt. (Fieber, Lymphadenopathie, Gesichtsschwellung, abnorme Blut-, Leber- u. Nierenwerte, in selt. Fällen m. dissemin. intravaskul. Gerinnung u. Multiorganversagen), TEN, Arzneimittel-exanthem mit Eosinophilie u. system. Sympt., Tics (motor. u./o. phonet.), Verwirrtheit u. Halluzinationen, Lupus-ähnliche Reaktion, Bewegungsstörungen, Standunsicherheit, Verschlimmerung bestehender Parkinson-Symptome, extrapyramidale Störung, Choreoathetose, Anfallszunahme, Blutbildveränderung (auch in Verbindung mit Überempfindlichkeitsreaktion) inkl. Neutropenie, Thrombopenie, Panzytopenie, Leukopenie, (aplast.) Anämie, Agranulozytose; Erhöhung der Leberwerte, Leberfunktionsstörung (gewöhnlich in Verbindung mit Überempfindlichkeitsreaktion, in Einzelfällen auch ohne), Leberversagen. *Häufig nicht bekannt:* Hypogammaglobulinämie, Lymphadenopathie, Pseudolymphom, akute psychot. Reaktion (z.B. paranoid. Zustand, Manie, Wahnvorstellung), Alpträume, Zwangsstörung, tubulointerstitielle Nephritis und tubulointerstitielle Nephritis-m. Uveitis-Syndrom; Berichte über SJS, DRESS, TEN, mehrheitlich Rückgang nach Absetzen; selten irrevers. Vernarbung od. Fälle mit tödlichem Ausgang; Abnahme der Knochendichte unter der Bildung der Osteoporose, bzw. hin zu patholog. Fraktur b. Patient unter Langzeittherapie. (Mechanismus der Beeinflussung des Knochenmetabolismus unklar).

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg; www.desitin.de

November 2023

Stand der Fachinformation:

Pflichttext

Lamotrigin Desitin® 5 mg/50 mg/quadro 100 mg/100 mg/ 200 mg Tabletten

Lamotrigin Desitin 5 mg Tabletten September 2023

Lamotrigin Desitin 100 mg Tabletten November 2023

Lamotrigin Desitin 50/200 mg Tabletten November 2023

Lamotrigin Desitin quadro 100 mg Tabletten September 2023