

Pflichttext:

Midazolam Desitin 2,5mg/5mg/7,5mg/10mg Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle

Überarbeitung: 07/2021

Midazolam Desitin 2,5mg/5mg/7,5mg/10mg Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle

Wirkstoff: Midazolam (als Midazolamhydrochlorid)

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: Jede vorgefüllte Applikationsspritze z. Anwend. i. d. Mundhöhle enth.: 2,5mg Midazolam in 0,5ml Lsg. / 5mg Midazolam in 1ml Lsg. / 7,5mg Midazolam in 1,5ml Lsg. / 10mg Midazolam (jeweils als Hydrochlorid) in 2ml Lsg. **Sonst. Bestandt.:** Natriumchlorid, ger. Wasser, Salzsäure 1 N (z. pH-Wert-Einstell. u. Umwandl. v. Midazolam in d. Hydrochloridsalz), Natriumhydroxid-Lsg. 0,1 N (zur pH-Wert-Einstell.).

Anw.-gebiete: Behandl. v. anhalt., akut. Krampfanfällen b. Säugl., Kleinkdrn. u. Jugendl. (zw. 3 Mon. u. < 18 J.).

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. Wirkst., Benzodiazepine od. e. d. sonst. Bestandt., Myasthenia gravis, schw. Ateminsuff., Schlafapnoe-Syndr., stark eingeschränkt. Leberfkt.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anwend.: Arznm. f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Enth. Natrium.

Nebenwirk.: *Häufig:* Sedier., Somnol., Bewusstseinsintrüb., Atemdepr., Übelk., Erbrechen. *Gelegentl.:* Pruritus, Hautausschl., Urtikaria. *Sehr selten (b. Kdr. u./od. Erwachs.):* Aggressivität, Agitierth., Zornausbrüche, Verwirrth., euphor. Stimm., Halluzinat., Feindseligk., tätl. Angriff, paradox. Reakt., anterog. Amnesie, Ataxie, Schwindel, Kopfschm., Krampfanf., Bewegungsstör., Müdigk., Bradykardie, Herzstillst., Blutdruckabf., Vasodilat., Apnoe, Dyspnoe, Laryngospasmus, Atemstillst., Obstip., Mundtrockenh., Schluckauf. *Nicht bek.:* Angioödem. B.ält. Pat. erhöht. Sturz- u. Frakturrisiko. B. Pat. m. vorbest. respirator. Insuff. od. eingeschränkt. Herzfkt. insb. b. hochdos. Gabe höhere Wahrscheinlichk. v. lebensbedrohl. Zwischenfällen.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, www.desitin.de

Stand der Information: Juli 2021