

Pflichttext:

**Timox[®] extent 150 mg/300 mg/600 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung,
Timox[®] 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen**

Timox[®] extent 150 mg/300 mg/600 mg Tabl. m. verändert. Wirkstofffreisetz. (im Folg. Timox[®] extent genannt), **Timox[®] 60 mg/ml Susp. z. Einn.** (im Folg. Timox[®] Suspension genannt).

Wirkstoff: Oxcarbazepin.

Verschreibungspflichtig.

Zus.: Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Tabl. Timox[®] extent enth. 150mg/300 mg/600 mg Oxcarbazepin, 1ml Timox[®] Suspension enth.: 60mg Oxcarbazepin. **Sonst. Bestandt.** Timox[®] extent: Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B), Riboflavin, mikrokrist. Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzl.]; **Sonst. Bestandt.** Timox[®] Suspension: Propyl(4-hydroxybenzoat) (E216), Saccharin-Na, Sorbinsäure (Ph. Eur.) (E200), Macrogolstearat 400, Methyl(4-hydroxybenzoat) (E218), Mirabellen-Zitronen-Aroma 39K 020, Ascorbinsäure (E300), mikrokrist. Cellulose, Carmellose-Na, Propylenglykol, Sorbitol-Lösg. 70% (nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), ger. Wasser. E. Bestandt. d. Aromas i. Ethanol.

Anw.-gebiete: Fok. Anfälle mit od. ohne sek. generalisierte ton.-klon. Anfälle in Mono- od. Kombinationstherap. bei Erw. u. Kdrn. ab 6 J.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoff, Eslicarbazepin od. e. d. sonst. Bestandt.

Warnhinw. u. Vorsichtsmaßn. für d. Anw.: Arzneim. f. Kdr. unzugängl. aufbewahr.; *zusätzl. bei Timox[®] Suspension:* enthält Parabene (E216, E218), Sorbitol-Lsg. u. einen gering. Alkoholanteil (weniger als 100mg/Einzelgabe).

Nebenwirk.: *Sehr häufig:* Schläfrigk., Kopfschm., Schwindelgef., Doppeltsehen, Übelk., Erbrechen, Müdigk. *Häufig:* Gewichtszun., Hyponatriäm., Verwirrtheitszust., Depress., Apath., Unruhe (z. B. Nervosität), Affektlabilit., Atax., Trem., Nystagm., Konz.schwäche, Gedächtnisstör. (Amnes.), Sprechstör. (einschl. Dysarthr.), häufiger b. Dosissteig., Verschwommenseh., Sehstör., Schwind., Diarrh., Verstopf., Bauchschm., Ausschlag, Alopez., Akne, Schwächegefühl. *Gelegentl.:* Leukopen., Hypothyreose, Hyperton., Urtikaria, Anstieg d. Leberenzymwerte u./od. der alkal. Phosphatase, Sturz. *Selten:* Knochenmarkdepress., aplast. Anäm., Agranulozyt., Neutro-, Panzytopen., anaphylakt. Reakt., Syndr. d. inadäquat. ADH-Sekretion, DRESS Syndr., akute general. exanthem. Pustulose (AGEP), Abn. d. Knochendichte unter d. Bild v. Osteopor. bis hin zu patholog. Fraktur. b. Langzeitther., Abfall v. T4 (klin. Bedeut. unklar). *Sehr selten:* Thrombozytopen., Überempf.-Reakt. (können mehr. Organe betr.): mögl. Sympt. Hautausschl., Fieber, Angioöd.; mögl. betroff. Organe: Blut-/Lymphsyst. (z.B. Eosinophil., Thrombo-, Leukopen., Lymphknotenschwell., Milzschwell.), Leber (z.B. Hepatit., Leberfunktionswerte außerh. d. Norm), Muskeln u. Gelenke (z.B. Gelenkschwell., -schm., Myalg.), Nervensyst. (z.B. hepat. Enzephalopath.), Niere (z.B. Nierenversag., interstit. Nephrit., Proteinur.), Lunge (z.B. Lungenöd., Asthma, Bronchospasm., interstit. Lungenerkr., Dyspn.). Hyponatriäm. m. klin. Sympt. (wie epilept. Anfall., Verwirrth., Bewusstseinstrüb., Enzephalopath., Sehstör. (z.B. Verschwommenseh.), Erbrechen u. Übelk.), Arrhythm., AV-Block, Pankreatit. u./od. Anstieg d. Lipase u./od. d. Amylase, Hepatit., Angioödem, Stevens-Johnson-Syndr., Lyell-Syndr. Erythema multiforme, system. Lupus erythematod.; Timox[®] extent: Verschlecht. d. bestehend. Anfallsleid. b. Kdrn. (b. Anfallsform. außerh. d. zugel. Anw. v. Timox[®] extent. Daher Anw. nur f. d. zugel. Anw.-gebiete!), allerg. Kreuzreakt. m. and. Antiepileptika.

Weitere Hinweise siehe Fach- und Gebrauchsinformation.

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, www.desitin.de

Stand der Information: August 2022

Pflichttext:

**Timox® extent 150 mg/300 mg/600 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung,
Timox® 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen**

Die einzelnen diesem Pflichttext zugrunde liegenden Fachinformationen haben folgenden Stand:

Timox® extent 150mg/300mg/600mg Tabletten mit veränderter
Wirkstofffreisetzung

März 2022

Timox® 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen

August 2022